

Le calendrier vaccinal juillet 2014

AGE	VACCIN	Observations
À la naissance	BCG*	- Vaccin contre la tuberculose* : 1 seule dose le plus tôt possible après la naissance. Ne sont plus indiquées dans la suite de cette 1 ^{ère} injection ni la pratique de l'IDR à la tuberculine ni le rappel par le BCG
	HBV-1	- La 1 ^{ère} injection de vaccin anti-hépatite B: cette prise est à administrer durant les 12 heures qui suivent la naissance quelque soit le résultat de la sérologie de l'hépatite B chez la mère
A 2 mois	Pentavalent-1 + VPO-1	- 1 ^{ère} injection de vaccin Pentavalent qui inclut le vaccin de l'hépatite B, le DTC (vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche) et le vaccin Hib (contre l'haemophilus type b) - 1 ^{ère} prise du vaccin oral contre la poliomyélite
A 3 mois	Pentavalent-2 + VPO-2	- 2 ^{ème} prise du vaccin pentavalent - 2 ^{ème} prise de vaccin polio oral
A 6 mois	Pentavalent-3 + VPO-3 + VPI	- 3 ^{ème} prise du vaccin pentavalent - 3 ^{ème} prise de vaccin polio oral - une prise de vaccin polio injectable
A 12 mois	RR-1	1 ^{ère} prise du vaccin anti-rougeoleux et anti-rubéole
A 18 mois	DTC-4 VPO- 4 RR-2	Rappel par les vaccins DTC, VPO et anti-rougeoleux et anti-rubéole
A 6 ans	VPO + RR	Rappels faits aux élèves en 1 ^{ère} année de l'école de base
A 7 ans	dT	Rappel en 2 ^{ème} année de l'école de base
A 12 ans	dT +VPO RR	Rappel en 6 ^{ème} année de l'école de base
A 18 ans	dT + VPO	Rappel en 3 ^{ème} année secondaire
Femmes en âge de procréer		Mise à jour de la vaccination anti-tétanique par le vaccin d.T
Mère en post-partum immédiat		Vaccin de la rubéole si non immunisée contre cette maladie