

إلى السيد رئيس المصلحة الجهوية
للرعاية الصحية الأساسية
تحت إشرافه السيد المدير الجهوي
للحصبة العمومية بـ : حافمة الولايا بت

الموضوع : العناية بحالات التهاب السحايا
المصاحبي : 7

وبعد، في إطار تدعيم التشخيص والعناية بحالات التهاب السحايا ومتابعة لتوصيات اجتماع رؤساء المصالح الجهوية بالعاصمة بتاريخ 29 جانفي 2004 حول المراقبة الوبائية للتهاب السحايا، أرجوكم العمل على تعزيز نظام الترصد والحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لما جاء من توصيات وخصوصا فيما يتعلق بـ:

١ - توسيع المراقبة لمتابعة التهاب السحايا البكتيري والفيروسي، و الحرص على التشخيص الجرثومي لكل الحالات.

٢ - إرسال العينات للمخبر في أسرع وقت : عند تشخيص حالة مشتبهة من التهاب السحايا يتم أخذ العينات اللازمة للتحاليل من دم وسائل النخاع الشوكي وإرسالها مباشرة (في نفس الساعة) إلى مخبر التحاليل.

٣ - تحليل وفحص العينات:
في مخبر التحاليل يقع الفحص المباشر للعينات (Examen direct) وإجراء التحاليل الكيميائية (examens cytochimiques) وكذلك التحاليل النوعية (Tests par Antigènes Solubles)، كما يتم القيام بزراعة بهدف التعرف على الجرثومة

5 – الإعلان عن الحالات:

يتم الإعلان عن الحالات المشتبهة من التهاب السحايا من طرف الطبيب المباشر حال تصنيفها بعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة.

ولهذا الغرض يمكن استعمال بطاقات التبليغ عن الأمراض ذات التصريح الإجباري مع الإشارة إلى الإلتهاب السحايا الوبائي (méningocoque) في الخانة المخصصة لذلك، وتدوين الأنواع الأخرى: (méningite bactérienne, méningite à haemophilus, méningite à pneumocoque, méningite virale) في الخانة المخصصة لأمراض أخرى : "autre maladie :.....

ويجب الإعلان الفوري عبر الهاتف والفاكس وغيرهما، عن كل حالات التهاب السحايا الوبائي (méningocoque)، كما يجب التثبيت من حالات التهاب السحايا الفيروسي المجتمعنة في بؤر والإعلام عنها في أقرب الآجال (تبليغ المصلحة الجهوية للرعاية الصحية الأساسية).

6 – النقصي النشيط لدى الأطفال دون 15 سنة :

ولتنظيم عملية متابعة الحالات المشتبه والحصول على المعلومات الوبائية الضرورية بالنسبة للأطفال دون 15 سنة يجب تدوين المعطيات الخاصة على دفتر يقع الاحتفاظ به لدى أقسام طب الأطفال.

كما يقوم الطبيب المنسق (médecin point focal) المكلف بمتابعة حالات الشلل الرخوي الحاد بتقصي حول حالات التهاب السحايا خلال نفس الزيارات الأسبوعية التي يؤديها لأقسام طب الأطفال والمخابر، وينقل المعلومات على بطاقة التبليغ المخصصة التي تجمع وترسل شهرياً صحبة جدول التقرير الشهري للأمراض المستهدفة بالتلقيح . و يقع التوضيح في هذا التقرير عن حالات التهاب السحايا البكتيري وعن حالات التهاب السحايا بالهيوموفيلوس (انظر اللوحة عن دور المدخنين وإرسال معطيات المراقبة).

7 – توفير الكواشف:

وفي خصوص توفير الكواشف اللازمة لتشخيص الحالات البكتيرية والتعرف على الجرثومة المتنسبية سوف تعمل إدارة الرعاية الصحية على تدعيم المخابر الجهوية للصحة العمومية بكميات Antigènes Solubles ، ريثما يتم التزود من هذه الكواشف عن طريق المستشفيات بعد إدراجها في قائمة المستلزمات الطبية وفي اعتمادات الميزانية بالنسبة للسنوات القادمة.

4 - تصنیف الحالة:

يتم إرسال نتائج التحاليل على الفور إلى الطبيب المباشر ويقع تصنیف الحالة السريرية إلى التهاب سحايا بكتيري أو التهاب سحايا من نوع فيروسي:

أ - في حالة التهاب السحايا البكتيري وعند التعرف على الجرثومة المنسوبة مباشرة Examen direct أو بعد التحاليل النوعية (Ag Solubles) يقع الإعلان عن الحالة حسب الجرثومة:

- méningocoque (*Neisseria*)
- *Haemophilus influenzae*
- Pneumocoque (*Streptococcus pneumoniae*)

كما يتم أخذ الإجراءات الوقائية الضرورية فورا عند اكتشاف حالة من نوع التهاب السحايا الوبائي (méningocoque).

ب - عند اكتشاف الجرثومة عن طريق زراعة العينات وفراعتها يقع الإعلان عن الحالة وأخذ الإجراءات الضرورية كما هو في الفقرة السابقة.

ج - في بعض الحالات التي يقع فيها العلاج بالمضادات الحيوية قبل التحاليل (méningite bactérienne décapitée)، ونظرا لسلبية الكشف المباشر والتحاليل النوعية Antigènes Solubles و الزراعة Culture négative التي يمكن أن تنتج، يتم الإعلان في هذه الصورة عن الحالة كالتهاب سحايا بكتيري إذا توفرت معطيات سريرية أو بيولوجية تدل على النوع البكتيري لهذا الالتهاب السحائي.

هـ - عند تبين حالة من التهاب سحايا فيروسي حسب معطيات التحليل والفحص المباشر، وبعد سلبية التحاليل البكتيرية والزراعة، يتم الإعلان عن الحالة كالتهاب سحايا فيروسي ويجب القيام بالتفصي الوبائي حولها لاستكشاف حالات أخرى مماثلة.

1 - إذا كانت الحالة منفردة تتم العناية بها كحالة وحيدة (علاج ومراقبة المخالطين لتفصي ظهور حالات أخرى مع الإعلان عن الحالة).

2 - في صورة اكتشاف حالات مجتمعة في شكل بؤرة، يجب أخذ عينات من بعض المرضى (دم - سائل نخاع شوكي - براز) لإرسالها لمخبر التحاليل الفيروسي بهدف التعرف على نوع الفيروس المنسوب تحسباً أن يكون من نوع وبائي Recherche étiologique du virus.

لذا يجب تقدير الحاجيات الأولية حسب النشاط المخبري وإرسالها لإدارة الرعاية الصحية الأساسية مع ضرورة متابعة الاستهلاك حسب عدد الحالات.

أما فيما يتعلق بتكوين الإطارات للتشخيص المخبري فإن إدارة الرعاية الصحية الأساسية سوف تواصل في تنظيم حلقات التكوين المستمر التي انطلقت منذ سنة 2003 لتسديد الحاجيات المقترحة من طرف الجهات.

8 – تشكيل القطاع الخاص:

يجب إعلام الأطباء والمصحات في القطاع الخاص بهذا النظام لمتابعة حالات التهاب السحايا وتشخيصها مع ضرورة تحسيسهم للمشاركة والإدلاء بالمعلومات والمعطيات الضرورية لتعزيز مكافحة هذه الأمراض.

من وزير الصحة العمومية
الأساسية المختصة
د. منيرة شيرشي قربو

قائمة خاصة بارقام الماقفه والفاكس
للادارات الجمومية للصحة العمومية بكافة الولايات

الولايات	رقم الماقفه	رقم الفاكس
تونس	71189630	71793015
أريانة	71719422	71718342
منوبة	70615434	70615471
بن عروس	71446000	71432544
نابل	72224334	72285869
زغوان	72680755	72676312
بنزرت	72444490	72431898
باجة	78454916	78452248
جندوبة	78600575	78601158
الكاف	78200337	78200337
سلیانة	78862826	78870929
القصرین	77474925	77474766
القیروان	77229494	77284200
سيدي بو زيد	76632180	76632534
سوسة	73224610	73228296
المنستير	73460384	73462077
مهدیة	73680600	73680872
صفاقس	74244624	74242610
قفصة	76220584	76226550
توزر	76453400	76471144
قبلي	75490021	75491923
قابس	75270097	75274288
مدنين	75641274	75643086
تطاویں	75870095	75870091
ادارة الرعاية الصحية الأساسية	71789148	71789679
قسم المراقبة الوبائية	71782848	