

منشور عدد ٢٠٧...٢٠١٥

٢٠١٥ جانفي ٢٧

الموضوع : المتابعة لموسم الأنفلونزا الموسمية (النزلة الوفادة) 2014-2015.

المصاحيب : - نسخة من جدول المراقبة الأسبوعية للنزلة الوفادة

(Relevé hebdomadaire de la surveillance de la Grippe)
(Fiche de signalement SARI) SARI

- طلب أخذ عينات لحالات النزلة الوفادة

(Demande d'analyse virologique pour ILI et SARI)

في إطار المتابعة لموسم الأنفلونزا الموسمية (النزلة الوفادة) 2014-2015 ونظراً لتشخيص حالات النزلة الوفادة A(H₁N₁) في البلدان المجاورة (ليبيا ومصر) في أواخر شهر ديسمبر 2014، تدعو وزارة الصحة كل العاملين بالقطاع إلى الاستعداد الجيد وتدعيم الوقاية والمراقبة للتقليل من الإصابات تفادياً لوفيات، كما تدعوهم إلى اليقظة تجاه أي تطور وبائي مع ضرورة أخذ الإجراءات العلاجية المناسبة للت�큲 بالمرضى.

1. تدعيم المراقبة الوبائية الموسمية بالهيأكل التالية :

• في الخطوط الأمامية (المراكز الصحية الأساسية، عيادات القطاع الخاص...) بمواصلة اليقظة والمراقبة تجاه الأنفلونزا الموسمية ILI (Grippe Saisonnière) والالتهابات التنفسية الحادة (SARI) بما في ذلك :

- مواصلة المراقبة الوبائية في مراكز الترصد (centres sentinelles) وتدعيمها بتشريك أطباء القطاع الخاص والحرص على متابعتها محلياً وجهويًا مع موافاة إدارة الرعاية الصحية الأساسية بالتقارير الأسبوعية.

- التبليغ الفوري لإدارة الرعاية الصحية الأساسية عن أي انتشار وبائي للمرض، محل المراقبة ارتفاع المؤشر (عدد حالات النزلة الوافدة بالنسبة للعدد الجملي للعيادات) إلى أكثر من 10 % في مراكز الترصد أو ظهور بؤر من الحالات المتجمعة في المكان والزمان.

- أخذ عينات من إفرازات المصابين بالأنفلونزا الموسمية بصفة منتظمة (1-3 عينات أسبوعياً من كل جهة) ورفع عدد هذه العينات أمام كل ارتفاع لعدد المصابين بهذا المرض أو عند ظهور حالات مجتمعة أو غير معتمدة من الناحية السريرية أو الوبائية وكذلك لدى الحالات التي وقع إيواؤها بالمستشفيات. ويتم إرسال كل هذه العينات للمخبر المرجعى للفيروسات بمستشفى شارل نيكول.

- إشارة تشخيص النزلة الوافدة A(H₁N₁) أمام كل مريض يحمل أعراض النزلة وقدام من البلدان التي يتواجد بها فيروس A(H₁N₁) (ليبيا ومصر) وأخذ العينات اللازمة.

• في المستشفيات بتدعم نظام المراقبة وبالتبليغ عن حالات الأنفلونزا التي وقع إيواؤها بالمستشفيات (SARI) وعن عدد الوفيات وذلك بـ :

- التبليغ أسبوعياً عن عدد الحالات التي تم إيواؤها بالمستشفى وعن عدد الوفيات إلى إدارة الرعاية الصحية الأساسية.

- تعمير استماراة لكل حالة أنفلونزا مؤكدة أو محتملة (النسخة المصاحبة)، عند مغادرة المريض للمستشفى أو المصححة الخاصة، وإحالتها إلى كل من إدارة الرعاية الصحية الأساسية (Fax : 71.789.679) والمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة (Fax : 71.894.533).

2. تدعيم عناصر الوقاية :

• الوقاية الأولية بالإعتماد على التوعية والتنقيف مع التأكيد على ضرورة التلقيح خصوصاً للفئات الأكثر عرضة لخطر الفيروس من مسنين وحوامل وأطفال ومصابين بأمراض مزمنة... وسبل الوقاية لتفادي العدوى وعزل المريض بالمنزل...

• مكافحة انتقال العدوى في المؤسسات الصحية بتفعيل الإجراءات الوقائية والضرورية وخاصة :

✓ اتخاذ إجراءات الحماية الشخصية من طرف أعون الصحة المعرضين للعدوى (القناع، القفاز،...).

✓ عزل المرضى وتفادي العدوى عند السعال والعطاس واستعمال الكمامات عند الحاجة.

✓ توفير كلّ مستلزمات غسل اليدين بالهياكل الصحية، واستعمال المحاليل المعقمة من طرف الأعون المباشرين لحالات الأنفلونزا.

• التكفل بالحالات المعرضة للخطورة :

- الأطفال دون السنين

- الفئة العمرية 65 سنة وما فوق

- الأشخاص المصابين ببعض الأمراض المزمنة كأمراض القلب، السكري، أمراض الرئة، أمراض الكلى، أمراض الدم، حالات ضعف جهاز المناعة...

- الأطفال من ذوي عوامل الخطر (Facteur de Risque)

- الحوامل في الثلاثي الثاني والثالث

- المصابين بالسمنة المفرطة.

3. استعمال الأدوية المضادة للفيروسات حسب توصيات المنظمة العالمية للصحة

: (Oseltavimir)

- الفئات المعرضة للخطورة المشتبه بإصابتهم بالأنفلونزا والذين لديهم عوامل خطر للإصابات بهذا المرض (الفئات التي ذكرت سابقاً)،

- المرضى والمصابين بحالة خطيرة من مرض الأنفلونزا والذين وقع إيواؤهم بالمستشفى.

4. الدعوة للتلقيح :

تحسيس الأطباء لوصف التلقيح للفئات التالية من المواطنين :

✓ المسنين الذين تجاوزوا سن 65 سنة،

✓ المرضى ذوي النقص في المناعة،

✓ المصابين بأمراض مزمنة (السكري، ارتفاع الضغط الدموي، أمراض الجهاز التنفسي، أمراض القلب...) بما في ذلك الأطفال الذين تجاوزوا سن الستة أشهر (مع استعمال


نصف كمية التلقيح dose 1/2)،

✓ الحوامل في الثلاثي الثاني والثالث،

✓ المصابين بسمنة مفرطة،

✓ العاملين في القطاع الصحي وفي نقاط العبور الحدودية.

ونظراً لأهمية الموضوع، وحرصاً على ضمان حسن سير اليقظة الوبائية والعمل بالإجراءات الوقائية والعناية الجيدة بالحالات، فإن وزارة الصحة تدعو كافة المديرين الجهويين إلى إعلام إدارة الصحة الوقائية والمستشفيات والمصحات الخاصة وعمادات الأطباء والصيادلة الجهوية بهذا المنشور.



المرسل إليهم السادة :

نلإعام

- أعضاء الديوان
- المديرون العامون ومديرو الإدارة المركزية
- المديرون العامون للمؤسسات العمومية للصحة
- مدير المستشفيات
- مدير مجامع الصحة الأساسية
- مدير المعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة
- الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمان البشري
- الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية للبلاد التونسية
- المدير العام للشركة التونسية للصناعات الصيدلية
- رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء
- رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة
- مدير المؤسسات الصحية الخاصة
- الإدارة العامة للصحة العسكرية
- إدارة مصالح صحية بوزارة الداخلية

نلإعام والمتابعة والتنفيذ

- الإدارة العامة للهيابكل الصحية العمومية
- إدارة الترتيب ومراقبة المهن الصحية
- المديرون الجهويون للصحة
- رؤساء اللجان الطبية الاستشفائية